

一些不法商贩为了牟取暴利选用了价格便宜的含铝疏松剂,导致膨化食品中铝含量的超标。因此为了解决这个问题,不仅要宣传教育居民改变面制食品传统的做法,而且要完善现行食品添加剂使用卫生标准。

针对义乌市市售面制食品中铝污染情况,为了保证居民健康,让他们尽量远离铝的危害,相关部门应采取积极有效的措施,减少食品中铝的污染:① 加强对街头摊点摊贩的有效监督和管理;② 加大力度整治不法商贩为牟取暴利而肆意添加含铝添加剂行为,坚决制止、控制不合格食品流入市场;③ 开展健康教育和健康促进,加强铝相关知识的健康教育和宣传,

增加居民的健康意识和自我保护常识,少吃油条等一些容易发生铝污染的食品;④ 有关部门应对铝添加剂列出含铝的限值标准,以便在源头上加强管理。

4 参考文献

- [1] 白雪松,杜鹃,宋春梅,等. 铝与人体健康的研究进展[J]. 吉林医药学院学报,2008,29(6):355-257.
- [2] 王林,苏德昭,王永芳,等. 中国居民每日摄铝量及面制食品中铝卫生标准研究[J]. 中国食品卫生杂志,1996,8(2):4.

(收稿日期:2012-11-20)

文章编号:1004-9231(2013)04-0206-02

· 妇幼卫生 ·

浙江省平阳县2008—2011年妇女健康促进工程项目实施情况分析

钟丽芝¹, 钟春燕², 项瓯³ (1. 浙江省平阳县妇幼保健院, 浙江 平阳 325401; 2. 浙江省平阳县麻步中心卫生院, 浙江 平阳 325401; 3. 浙江省温州市妇幼保健所, 浙江 温州 325000)

妇女健康促进工程项目是一项意义重大的民生项目。为切实保障妇女健康权益,根据《浙江省妇女健康促进工程实施方案》要求,结合我县广大妇女群众的实际需求,我们每2年对已婚育龄妇女实行1次免费妇科病检查,现将结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 对象

2008—2011年平阳县户籍的已婚育龄妇女。

1.2 方法

根据《浙江省妇女健康促进工程实施方案》要求,统一使用浙江省妇女健康促进工程项目体检表、妇女病检查登记表,由指定的卫生院及平阳县妇幼保健院组织实施体检,检查项目为妇科检查、阴道分泌

物检查、宫颈细胞学检查。阴道炎统计以分泌物实验室诊断为准,宫颈糜烂以Ⅱ度以上计数,体检结果由各乡镇妇幼保健人员反馈、随访。

2 结果

2.1 妇科病检出率及其变化趋势

2008—2011年参加检查的妇女人数共85461人,平均疾病检出率为28.8%。4年来疾病检出率、阴道炎检出率、宫颈糜烂及宫颈癌均呈现逐年下降趋势(表1)。

2.2 检出疾病治疗率的变化情况及趋势

针对检出的疾病按即查即治的原则^[1],及时给予积极治疗。4年来阴道炎治疗率、宫颈糜烂治疗率及宫颈癌治疗率均呈上升趋势(表2)。

表1 2008—2011年妇科病检出情况

年份	总检查人数	检出疾病例数	疾病检出率(%)	阴道炎		宫颈糜烂		宫颈癌	
				检出例数	检出率(%)	检出例数	检出率(%)	检出例数	检出率(‰)
2008	10893	3856	35.40	1877	17.23	1969	18.08	10	0.92
2009	17728	5509	31.08	2762	15.58	2736	15.43	11	0.62
2010	20436	5768	28.22	2611	12.78	3145	15.39	12	0.59
2011	36404	9482	26.05	4454	12.23	5017	13.78	11	0.30
合计	85461	24615	28.8	11704	12.88	12867	15.46	44	0.51

作者简介:钟丽芝(1974—),女,畲族,主治医师。

表 2 2008—2011 年检出疾病治疗率(%)

年份	阴道炎			宫颈糜烂			宫颈癌		
	检出例数	治疗例数	治疗率	检出例数	治疗例数	治疗率	检出例数	治疗例数	治疗率
2008	1877	1576	83.96	1969	1598	81.16	10	9	90.00
2009	2762	2489	90.12	2736	2283	83.44	11	11	100.00
2010	2611	2352	90.08	3145	2824	89.79	12	12	100.00
2011	4454	4202	94.34	5017	4493	89.56	11	11	100.00
合计	11704	10619	90.73	12867	11198	87.02	44	43	97.73

3 讨论

根据普查结果分析,在我县妇科疾病普查质量、疾病治疗方面还有待加强。虽然疾病治疗率在逐年上升,但还是没有达到一个满意的水平,阴道炎历年总的治疗率为 90.73%,这与实验室检测结果提示有炎症反应,患者本人无自觉症状而拒绝治疗有关。宫颈糜烂历年总的治疗率为 87.02%,这与宫颈糜烂是一种慢性疾病,多无明显不适,患者用药的积极性和依从性均会下降有关。宫颈癌的治疗率较高,除 2008 年有 1 例失访未列入统计外,其余均能积极参与治疗,这与疾病的严重程度和群众保健意识增强有关。目前存在问题和改进措施如下:

3.1 农村妇女的健康意识较薄弱

该项目工作大都是面向农村妇女开展的,早期开展时有些农村妇女保健意识较差,参与普查的积极性不高,普查参与人数较少。所以重视宣传教育,普及健康知识,提高妇女自我保健意识是至关重要的。通过印发宣传资料,电视媒体,责任医师动员等各种方式,使妇女群众变被动为主动,能积极地参与。对早发现、早诊治妇科常见病和进一步控制疾病的蔓延起了很好的作用。

3.2 由于条件限制使一些项目难以开展

为方便妇女就近接受检查,通过努力,完善乡镇卫生院功能,原则上常见妇科疾病检查工作由妇女居住地所在的乡镇卫生院承担,如果有些乡镇卫生院难以胜任,由县妇幼保健院派遣技术人员予以支援。实施“妇女健康促进工程”项目与农民健康体检工作相结合,将常见妇科疾病检查列入每 2 年 1 次的农民健康体检项目。与社区卫生服务相结合,检查情况记录在个人健康档案,做好后续服务,实行动态管理。在流程上合理安排,方便群众,以提高体检率。

3.3 基层妇科卫技人员力量良莠不齐

要保证妇女病普查工作的质量,首先对各乡镇从事妇科健康体检的人员就妇科普查的技能、档案的填写、操作规范等进行培训,再组织专家赴现场技术指导。宫颈细胞学阅片工作交由平阳县人民医院病理科和有资质的检验公司承担,我们对细胞学玻片进行抽样质控。

3.4 增加普查项目

增加阴道 B 超检查、乳腺癌筛查等,可以在妇科病的诊断方面得到一个提高,也更能受到群众欢迎。引进先进技术,针对不同的高危人群设计不同的普查项目,以减少投入,提高效益^[2]。

3.5 普查工作要防治结合

有开展条件的乡镇卫生院要配备妇科常用药,要妇幼保健院协助开展工作的乡镇由妇幼保健院带药,对于诊断出的疾病要现场配药,这样不仅提高疾病治愈率,也给群众带来方便,提高人群认可度。对于乡镇卫生院条件所限无法确诊的疾病,要追踪随访,积极督促其去上级医院做进一步检查。

3.6 妇科病普查普治是群众性保健工作

承担这项工作的各有关部门应当相互协调,加强协作,共同促进各项措施的落实。在操作流程上分工明确,环环相扣,是促使该项目顺利完成的关键,使妇女的健康水平得以提高。

4 参考文献

- [1]熊庆,吴康敏. 妇女保健学[M]. 北京:人民卫生出版社, 2007:286.
- [2]华嘉增. 妇科病普查普治的回顾和展望(下)[J]. 中国妇幼保健,2002,17(4):239.

(收稿日期:2012-10-26)